

::: Upute za pripremu pacijenata prije određivanja pretraga za zgrušavanje krvi

Određivanje PV/INR-a u praćenju oralne antikoagulantne terapije (OAT)

- Na dan izvođenja pretrage ne uzimati oralnu antikoagulantnu terapiju prije vađenja krvi! Terapija se uzima nakon uzimanja krvi.
- 3-5 dana prije izvođenja pretrage ne smiju se uzimati veće količine namirnica bogatih vitaminom K (rajčica, banana, zeleno lisnato povrće: brokula, špinat, zelena salata, blitva, kelj, šparoge).

Pretrage ispitivanja funkcije trombocita (agregacija trombocita)

- U dogovoru s liječnikom, 7 dana prije izvođenja pretrage pacijent ne smije uzimati nesteroidne protuupalne lijekove (*Andol, Aspirin, Indometacin, Ibuprofen*) zbog utjecaja terapije na rezultate pretraga.
- Izuzetak su pacijenti kojima liječnik izričito traži pretragu funkcije trombocita upravo zbog kontrole antiagregacijske terapije.

Važna napomena za pretrage probira na trombofiliju

- Pacijentima koji su na terapiji oralnim antikoagulantnim lijekovima ne uzima se uzorak za sljedeće pretrage: **protein C, protein S, lupus antikoagulans, antitrombin i rezistencija na aktivirani protein C (APC rezistencija)** zbog značajnog utjecaja lijekova na rezultate navedenih pretraga.

Izvor:

Kako se pripremiti za laboratorijsku pretragu,

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, Vinogradska cesta 29, Zagreb, 2017.